LE MELANOME: ASPECTS BIOLOGIQUES, CLINIQUES ET EXPERIMENTAUX: APPROCHE EXPERIMENTALE CONTROLANT LA PROLIFERATION TUMORALE PAR INHIBITION DU FACTEUR DE CROISSANCE IGF-I (INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR I) PDF - Télécharger, Lire

TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

Le mélanome, cancer de la peau suspecté à l'examen visuel,présente un taux de rémission considérable au stade de tumeur primitive, mais peu de traitements sont actuellement efficaces au stade métastatique. C'est pourquoi nous avons choisi développer une nouvelle approche thérapeutique, sur le principe de l'immunothérapie. Après un rappel concernant les aspects biologiques et cliniques du mélanome, nous avons examiné la modulation de molécules impliquées dans la reconnaissance immune (CMH-I et B7.1/CD80) et dans les interactions cellulaires (tétraspanines CD9 et CD81, l'intégrine alpha4/CD49d) dans des cellules de mélanome B16F0 inhibées pour l'expression de l'insulin-like growth factor I (IGF-I) par un vecteur épisomal antisens. L'inhibition de l'IGF-I ne modifie pas l'expression de CMH-I, ni de B7.1/CD80. Par contre, les cellules transfectées révèlent une inhibition quasi-totale de l'expression de la molécule CD9, sans modulation de CD81 et CD49d. Inoculées chez des hôtes isogéniques, les cellules transfectées induisent un retard significatif du développement

tumoral, avec une amélioration de cinquante pour cents concernant la survie.

Insulin-like growth factors and diabetic embryopathy: The expression of IGFs . Le Melanome: Aspects Biologiques, Cliniques Et Experimentaux: APPROCHE EXPERIMENTALE CONTROLANT LA PROLIFERATION TUMORALE PAR INHIBITION DU FACTEUR DE CROISSANCE IGF-I (INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR I) (.
Rôles régulateurs des GTPases Rho dans l'immunité anti-mélanome . La cellule dendritique plasmocytoïde dans l'immunité anti-tumorale, de son mode d'activation à sa . APPROCHE EXPERIMENTALE CONTROLANT LA PROLIFERATION . DU FACTEUR DE CROISSANCE IGF-I (INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR I).
. BIOLOGIQUES, CLINIQUES ET EXPERIMENTAUX: APPROCHE EXPERIMENTALE CONTROLANT LA PROLIFERATION TUMORALE PAR INHIBITION DU FACTEUR DE CROISSANCE IGF-I (INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR I) . Cuisinez bio avec les oléagineux · Papyrus, Tome 9 : Les Larmes du géant · Après le.
IGF-1. Insulin Growth Factor 1. IL. Interleukine. ILT. Immunoglobulin-like transcript .. Cytokines contrôlant le développement des cellules dendritiques .. clinique pour inhiber la croissance des cancers du sein hormono-dépendant (Shang, 2006). Enfin ... Que ce soit chez l'Homme ou dans des modèles expérimentaux,.
2 avr. 2015 . Application au mélanome. ... FREYMANN, Michel RECHERCHES EXPERIMENTALES SUR LE COIFFAGE .. KLEIN, Jean-Louis INHIBITION DE LA PROLIFERATION DE .. biologique et médical physiologie expérimentale et clinique .. ET SUR LA PRODUCTION D'INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR .
16 févr. 2012 . ➢Les protéines matricielles et les facteurs de croissance. 72 . La prolifération et la différenciation cellulaire. 78 . IGF : Insulin-like Growth Factor .. la réponse piezoélectrique d'échantillons biologiques à une échelle ... anticorps inhibe la différenciation ultérieure des ostéoblastes (Moursi, Damsky et al.
Parmi les autres autorisations, difficile de ne pas citer celle de I'inhibiteur du BCR .. une approche preliminaire, et pour I'instant sans rapport avec le devenir clinique .. L'expression du recepteur de l'IGF-1 est augmentee dans certaines tumeurs ... Bulletin du —CANCER Expression of the Type 1 insulin-like growth factor.
Approche mondiale de la lutte contre le cancer. 314 . reflètent généralement une exposition à des facteurs environ- .. systèmes expérimentaux appropriés, les .. PRÉVENTION PRIMAIRE ET INTERVENTIONS CLINIQUES .. facteurs de croissance comme l'insuline et ... gènes contrôlant la prolifération cellulaire,.
KLEIN, Jean-Louis INHIBITION DE LA PROLIFERATION DE CELLULES .. biomédical biologique et médical physiologie expérimentale et clinique .. CHAJES, Véronique LIPIDES ET CROISSANCE TUMORALE DANS LE .. FOUQUE, Denis PHYSIOPATHOLOGIE DE

L'INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR (IGF)-1 EN.
Hepatocyte nuclear factor-la (Hnfl a). 20 .. Recepteur du facteur de croissance epidermique ... signalisation qui maintiennent la nature des cellules souches et controlent la proliferation, la ... La demonstration experimental de 1'importance de Cdx2 pour la .. Une approche .. insulin-like growth factor binding protein 3.
Coupe histologique d'un adénocarcinome de prostate de type acineux, le plus répandu des .. De nombreux facteurs d'origine génétique, toxicologique et liés au régime alimentaire .. rapport PSA libre / PSA total, ou encore la cinétique de croissance du taux sur 2 ans. . L'examen clinique fondamental est le toucher rectal.
Portada del libro de Stress hypoxique et immunoévasion tumorale . Un essai clinique testant l'ivermectine sur les nématodes gastro-intestinaux des lémuriens en captivité . APPROCHE EXPERIMENTALE CONTROLANT LA PROLIFERATION . DU FACTEUR DE CROISSANCE IGF-I (INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR I).
9786131566868: LE MELANOME: ASPECTS BIOLOGIQUES, CLINIQUES . C'est pourquoi nous avons choisi développer une nouvelle approche . B16F0 inhibées pour l'expression de l'insulin-like growth factor I (IGF-I) par .. PAR INHIBITION DU FACTEUR DE CROISSANCE IGF-I (INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR I).
I - Genetique 17-001-A-10 Aspects genetiques des tumeurs cerebrates primitives . ont permis de reveler, en partie, la signification clinique et biologique de ces . Au contraire, I'amplification du gene du recepteur au facteur de croissance .. les voies de signalisation de 1 'insulin like growth factor 1 (IGF-1) et de l'insuline.
Nouveaux aspects New insights into adipose cell biology I. Dugail 1367 Elements . de l'axe somatotrope (hormone de croissance, insulin-like growth factors) a connu ces . L'action des deux IGF est mediee par le recepteur des IGF de type 1. . IGF-I) est tres implique dans la croissance staturo-ponderale postnatale et la.
V.1.2.2- Démarche expérimentale PAGEREF _Toc200820268 \h 91 .. Ces facteurs de croissance sont d'importants régulateurs de plusieurs processus . en régulant de nombreuses fonctions biologiques telles que la prolifération, .. de liaison de l'IGF-1, IGFBP-3 (insulin like growth factor binding protein-3) d'où son.
KLEIN, Jean-Louis INHIBITION DE LA PROLIFERATION DE CELLULES ... UBEAUD. expérimentale et clinique pharmacologie pharmacie galénique ... Véronique LIPIDES ET CROISSANCE TUMORALE DANS LE CANCER DU SEIN. .. Denis PHYSIOPATHOLOGIE DE L'INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR (IGF)-1 EN.
Les méthodes biologiques appliquées à la vinification et à l'oenologie - Annunci - méthodes biologiques appliquées . Le melanome: aspects biologiques, cliniques et experimentaux: approche experimentale controlant la proliferation tumorale par inhibition du facteur de croissance igf-i (insulin-like growth factor i).
After a detailed description of the experimental setup developed for this purpose, ... Cette precision est le facteur cle permettant aux industriels de controler ... Articles and websites that explored an aspect of social circuses or that .. Herein we investigated the role of TSH, insulin and insulin-like growth factor 1 (IGF-1),.
sur les récepteurs et les facteurs de croissance par lesquels les cellules . mier inhibiteur naturel de l'angiogenèse utilisé en clinique a été l'interféron alpha.
Enfin dans le but de poursuivre ces etudes avec des systemes de plus grande taille, un nouveau dispositif experimental, developpe durant la these et base sur.
15 nov. 2005 . plasminogène) ainsi que des facteurs de croissance (Alexander, 1998). ... prolifération cellulaire et de la contractilité vasculaire (Nabel ,1991). ... 13 FGF: fibroblast growth factor, IGF: insulin-like growth factor, HGF: hepatocyte . expérimentaux

d'hypertension artérielle pulmonaire induit par un toxique (la.
26 mars 2016 . I would like , on behalf of the director office of the SANMO and all its members, to send very warm . suis le médecin chef ici à la clinique Riordan et ... au service d'une approche globale de la prise en .. In fact, a large experimental study published in ... niveaux d'insuline et d'IGF-1, facilite la genèse des.
4 janv. 2016 . Le rôle de l'EMT dans la progression tumorale et les métastases .....19 ... IV.3.1.2 Inhibition de l'activité lytique des cellules cytotoxiques . ... Ainsi, et vu les données expérimentales récentes, il est d'une .. Les facteurs de croissance comme l'IGF (Insulin-like Growth Factor) se lient à leurs.
L'inhibition de l'IGF-I ne modifie pas l'expression de CMH-I, ni de B7.1/CD80. . ASPECTS BIOLOGIQUES, CLINIQUES ET EXPERIMENTAUX: APPROCHE EXPERIMENTALE CONTROLANT LA PROLIFERATION TUMORALE PAR INHIBITION DU FACTEUR DE CROISSANCE IGF-I (INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR I).
I.5 Traitement des cellules MCF7 avec le facteur de croissance FGF-7. 87 .. Spécificité de substrat et activité biologique médiée par des . Hereditary Multiple Exostoses. IGF-2. Insulin-like Growth Factor 2. HBPM ... modèle expérimental de souris en régulant la migration cellulaire, la prolifération et .. contrôler la diffusion.
Les mélanocytes choroïdiens normaux et malins : de la cellule à la clinique . Pourtant, le mélanome de la choroïde est la tumeur maligne primitive oculaire la plus .. Ces facteurs de croissance modifient leurs effets biologiques — prolifération, survie, . De façon récente, il a été démontré que l'Insuline Growth Factor (IGF).
C'est pourquoi nous avons choisi développer une nouvelle approche . L'inhibition de l'IGF-I ne modifie pas l'expression de CMH-I, ni de B7.1/CD80. . Le Melanome: Aspects Biologiques, Cliniques Et Experimentaux (Paperback) . de melanome B16F0 inhibees pour l expression de l insulin-like growth factor I (IGF-I) par.