

Pétrographie, stratigraphie et structure de la ceinture de "schistes verts" de Noranda PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

31 déc. 2016 . Notre structure du capital est composée d'un nombre illimité d'actions .. Partout au pays, plusieurs ceintures de roches vertes dissèquent le . métamorphisées au faciès des schistes verts et ont subi au moins .. Il suit un axe N-S, parallèle à la stratigraphie locale, et est

incliné vers l'ouest. .. Noranda.

Le gisement de classe mondiale V/estwood, qui fait partie de la ceinture de ... métamorphisme régional varie du faciès des schistes verts supérieur et à celui des . lentilles de sulfures massifs volcanogènes (SMV) dans la stratigraphie . (Annexe C), ainsi que la chimie minérale (Annexe B) et l'étude pétrographique.

FACIES LITHOLOGIQUES, STRUCTURES ET MINERALISATIONS .. Burkina Faso : 1 Ceintures de roches vertes paléoprotérozoïques/birimiens. ... et en général, que du point de vue stratigraphique, l'altération est plus intense au mur .. 2-Associations minérales du métamorphisme général (faciès des schistes verts) .

des types de roches et de structures, de même que des ... et de Rouyn-Noranda. ...

Stratigraphie du Supergroupe de Huronian à Elliot Lake, . Witwatersrand ainsi que dans la ceinture de roches vertes .. été métamorphisées au faciès des schistes verts. .. terminologie des descriptions pétrographiques ont égale-

24 mars 2005 . et ouest de la structure anticlinale du Dôme de Lemieux. Les stra- . métamorphisée au faciès schistes verts. Le sud du Dôme de Lemieux.

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE DU CAPITAL du Québec, notamment dans la région de la Baie James, qui comprend plusieurs ceintures de roches vertes achéennes connues .. Val-d'Or et à quelque 80 km à l'est de Rouyn-Noranda, sur la route 117. .. l'Abitibi sont métamorphosés en faciès de schistes verts.

. -how-organisational-structures-affect-knowledge-processes 2017-10-31T00:10:30+00:00 weekly 0.5 .. weekly 0.5 <http://gvate.tk/telecharger/b00hr9mikc-petrographie-stratigraphie-et-structure-de-la-ceinture-de-schistes-verts-de-noranda>.

15 févr. 2000 . schistes verts. ... Fig.22 Subdivision chimico-stratigraphique des roches volcaniques du .. observées dans les gîtes de SMV de type Noranda ou Matagami (Cu-Zn). . car l'étude pétrographique et minéralogique montre que la pyrite, .. ceinture de l'Abitibi sont situés dans des terrains essentiellement.

Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques, BP 20, 54501 - Van- .. Noranda SMDC .. River Shear Zone, une ceinture étroite de gneiss blastomylonitiques .. tes, les paragenèses indiquent un faciès schistes verts supérieurs à .. EUPENE G.S., 1979 - Stratigraphie and temporal control of mineralisation.

208 208 Observations pétrographiques... .. La partie « schistes verts » de l'altération régionale semi-concordante se manifeste par les minéraux .. Structure et stratigraphie du camp Structure régionale Sharpe (1968) propose .. que du district, par exemple dans le camp de Noranda (Knuckey et al., 1982; Gibson, 1990;).

. -organisational-structures-affect-knowledge-processes 2017-10-27T00:10:28+00:00 weekly .. weekly 0.5 <http://96hendersoncz.tk/telecharger/b00hr9mikc-petrographie-stratigraphie-et-structure-de-la-ceinture-de-schistes-verts-de-noranda>.

49 14:55 M. Bardoux et Y. Crepeau: Lithostratigraphie, structure et . D. Blais et M. Jebrak et A. Tremblay: Petrographie et géochimie des roches volcaniques de . Imreh: Evolution et métallogénie de la ceinture volcanique de Caldwell dans leur .. L'ensemble de la séquence est métamorphosée au faciès des schistes verts.

Le degré métamorphique passe alors du faciès des schistes verts à celui des . à la fabrique tectonique dominante de la ceinture, montrent une évolution en .. dans les districts de Val-d'Or et de Rouyn-Noranda, lesquels ont largement profité des .. DAIGNEAULT, R. - ALLARD, G.O., 1983 - Stratigraphie et structure de la.

4 mars 2013 . 1.13: Log stratigraphique de la Formation de Sakami au lac Tilly ... sédimentaires métamorphosés et des ceintures de roches vertes (Simard ... structures, impliquant le socle et la couverture volcano-sédimentaire : ... Le faciès métamorphique ne

dépasse pas le niveau des schistes verts puisque le quartz.

30 avr. 2006 . DESCRIPTION DE LA STRUCTURE DU CAPITAL . . . Entre 1976 et 1980, Explorations Noranda . groupe Prince Albert est exposé en plusieurs ceintures et en quelques .. stratigraphie révèle que les strates ont subi l'intrusion de dykes de . intensité du métamorphisme de faciès des schistes verts.

Pétrographie, stratigraphie et structure de la ceinture de "schistes verts" de Noranda, dans les cantons de Hébecourt, de Duparquet et de Destor, Québec,.

13 janv. 2015 . 6.1.3 Interprétation de la structure du gisement de Ouiksane .. L'appartenance du Rif à la ceinture des Maghrébides impose que l'on s' ... métamorphisme de faible grade (faciès des schistes verts, 3 kbars, ... extensive d'un point de vue stratigraphique et structural, aucun .. Rouyn-Noranda, Quebec.

24 Sep 2017 . Boivin, P Pétrographie, stratigraphie et structure de la ceinture de schistes verts de Noranda, dans les cantons de Hébecourt, de Duparquet et.

La mine Marban est située dans le sud de Ja ceinture de roches vertes de . Aujourd'hui, il est encore difficile de comprendre la structure complète de ces ... succession stratigraphique alternant des roches volcaniques et .. faciès de schistes verts, suggérant que le métamorphisme régional est .. Noranda area, Quebec.

Pétrographie, stratigraphie et structure de la ceinture de "schistes verts" de Noranda, dans les cantons de Hébecourt, de Duparquet et de Destor, Québec,.

Pétrographie, stratigraphie et structure de la ceinture de « schistes verts » de Noranda, dans les cantons de Hébecourt, de Duparquet et de Destor, Québec,.

Noté 0.0/5: Achetez Pétrographie, stratigraphie et structure de la ceinture de "schistes verts" de Noranda de BOIVIN PIERRE: ISBN: sur amazon.fr, des millions.

Télécharger Petrographie Stratigraphie Et Structure De La Ceinture De Schistes Verts De Noranda livre en format de fichier PDF EPUB gratuitement sur.

Érosion et corrosion (Géologie); Pétrographie; Géochimie .. Ce sont des fragments d'amphibolite, roche métamorphique, dont on reconnaît la structure feuilletée. .. faciès des schistes verts supérieur; sous-faciès supérieur des schistes verts ... Les roches encaissantes des gisements du district de Rouyn-Noranda et du.

1 avr. 2014 . de la structure de l'économie canadienne, et le Nord, qui occupe les deux .. la ceinture de roches vertes de Hackett River dans la province structurale des . SMV, découvert par Noranda Mining et Exploration Inc. en 1979, .. allant des schistes verts aux amphibolites, préservés dans des ceintures.

(3) Sous ces schistes verts se trouvent les couches violacées du Fort .. Pétrographie, stratigraphie et structure de la ceinture de « schistes verts » de Noranda,.

Annexe 2 : Echelle stratigraphique internationale 2009. .. Continental evolution : The Geology of Morocco ; structure, .. ABIA E. H. (1991) : Cartographie, pétrographie et métallogénie du Protérozoïque .. surface des schistes verts en contrebas de la falaise. .. La boutonnière est ceinturée par des crêtes de terrains in-.

18 xviii LISTE DES FI GURES Figure Carte géologique de la ceinture de .. sud de la ceinture de l'abiti à 10 km au riord - ouest de la ville de Rouyn-Noranda. . schistes verts et il atteint le faciès de l'amphibolite au contact des intrusions. . en ordre stratigraphique, les Groupes de Kinojévis, de Malartic et de Blake River.

Le métamorphisme des roches volcaniques au faciès des schistes verts ou en . la région de Burnt Lake, Domaine Belmont de la Ceinture centrale de métasédiments, . du Sous-groupe de Noranda supérieur, et pour lesquelles la stratigraphie . dans les différents ensembles de petrogénese et de structures géologiques.

The regional metamorphism in the area of Rouyn-Noranda ranges the .. «Pétrographie,

stratigraphie et structure de la ceinture de schistes verts de Noranda.

11 juin 2012 . concentre sur l'or dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi au Québec. ... Le projet est situé sur la structure aurifère dominante de la région, soit la ... Cartier a mandaté la société Gescad (Rouyn-Noranda) pour le suivi de ces ... roches sont généralement métamorphisées au faciès des schistes verts.

16 sept. 2017 . Pétrographie endogène, minéralogie, métamorphisme, gradients et . La ville de Rouyn-Noranda sera notre camp de base et le Cégep de l'Abitibi- . Le lien suivant décrit bien le cadre et le programme d'étude de la structure : .. La ceinture de l'Abitibi, qui fait elle-même partie de la Province archéenne.

Témiscamingue (URSTM-UQAT), Rouyn-Noranda, Québec, J9X 5E9. 2 Ministère des .. schistes verts, tandis que les partie nord-est et nord- ouest sont au.

3 févr. 2000 . Structure: les roches de la région ont été affectées par deux phases .

Pétrographie: le Groupe de Blake River est constitué . schistes verts, zone de la chlorite, à l'est. .. la stratigraphie de la ceinture Abitibi dans la région de Rouyn- .. 19788) dans la région de Rouyn-Noranda,proposent comme.

complexes dans cette unité stratigraphique qu'ils ne le sont à l'extérieur de celle-ci. ... 3.2.2

Pétrographie des faciès du filon-couche de Bourbeau à la .. la région de Chibougamau fait partie de la ceinture de roches vertes de .. par un métamorphisme régional de type schistes verts qui a principalement engendré une.

Figure 2 : Ceintures orogénique, métacratons et craton Précambriens .. stratigraphie (Kasser, 1998 ; Doumnang, 2006 ; Pouclet et al., 2006 ; Vidal et al., 2004), sur la .. caractérisation de la pétrographie des roches de la géochimie en éléments .. faciès schistes verts est légèrement supérieur à celui de la série de.

2.2 Stratigraphie régionale 2.2.1 Généralités Les groupes, Groupe roches soit de . La Bordeleau (dans la , présente structure très localement dans la région de . de généralement métamorphique proximité du front au faciès des schistes verts. .. étudiés la à fracturation inclusions formation point de de vue pétrographique.

6 - 3 - 1 - Variations géochimiques en fonction des faciès pétrographiques 179 .. Pétrographie, stratigraphie et structure de la ceinture de "schistes verts" de Noranda dans .. Archean mafie metavolcanics from the Rouyn - Noranda district.

Survey ou le code stratigraphique nord-américain n'a pas été examiné. . ou des métaux précieux existe en Mauritanie, au sein des ceintures de roches ... Âges maximum de dépôt du zircon détritique des unités pétrographiques au sein ... bien étudiés (par exemple le type Kuroko, le type Besshi, le type Noranda, le type.

Noranda [PDF] by BOIVIN PIERRE. Title : Pétrographie, stratigraphie et structure de la ceinture de "schistes verts" de Noranda. Author : BOIVIN PIERRE. 1 / 3.

Nature structures porteuses : 2 failles de 2ème ordre parallèles Faille Cadillac, longueur . québécois, Livret Guide, Symposium de Rouyn-Noranda. Morasse S .. faciès non altéré des dykes étant aux schistes verts tandis que les veines sont .. constitué, du bas vers le haut stratigraphique, de gabbro, diorite quartzique,.

Figure 1.1 : Géologie générale de la ceinture de roches vertes d'Abitibi incluant . Figure 1.4 : Géologie et structures locales du gisement de East-Sullivan. . étude stratigraphique à l'aide de forages au diamant ; 3) une étude pétrographique .. majoritairement métamorphisées au faciès des schistes verts, avec quelques.

un boudinage qui donne naissance à une structure particulière de l'amas, c'est une succession de ... LA STRATIGRAPHIE DE LA SERIE DE SARHLEF : ... de faible degré (épizone, faciès schistes verts), sauf dans le massif des Rehamna où il atteint la .. Chapitre V : Etude pétrographique et métallogénique :.

11 déc. 2006 . Tous ces travaux ont permis de mettre en valeurs trois structures aurifères dignes d'intérêt : la . de Baby font partie de la ceinture de roches vertes de Belleterre. .. Geologica Groupe-Conseil inc. incluant la pétrographie. . de Rouyn-Noranda (Québec).5 Km au NNO du village de Belleterre (figures 1 et 2).

Ceinture de l'Abitibi et complexes volcaniques de Goodwin et Ridler (1970)., 3. Stratigraphie régionale. 5. Géologie du complexe volcanique de Noranda. 7.

1986 — Stratigraphie et significations des minéralisations dans le secteur du mont . avec une nouvelle méthode de volumes finis pour maillages non structurés .. Piedra Alta terrane = (Petrographie et géochimie de cinq plutons granitiques du . mafiques archéennes de Macanda, Canton Beauchastel, Noranda, Québec.

Pétrographie, stratigraphie et structure de la ceinture de "schistes verts" de Noranda, dans les cantons de Hébecourt, de Duparquet et de Nestor, Québec,.

26 nov. 2009 . 9 h 50 Synthèse de l'évolution stratigraphique et tectonique du Nord du .

émérite. Exploration aurifère dans les ceintures de roches vertes :

and alteration at the Delbridge massive sulfide deposit, Noranda, Quebec. J. ... (140-300°C) et un métamorphisme métagénétique de faciès schistes verts . Le gisement de Hellyer, découvert en 1983 dans la ceinture volcanique .. stratigraphique, a été reconnu par quelques sondages ; il est constitué de pyrrhotite.

Pétrographie, stratigraphie et structure de la ceinture de "schistes verts" de Noranda, dans les cantons de Hébecourt, de Duparquet et de Destor, Québec,.

. -how-organisational-structures-affect-knowledge-processes 2017-10-21T00:10:30+00:00

weekly 0.5 .. weekly 0.5 <http://lf6bj.tk/telecharger/b00hr9mikc-petrographie-stratigraphie-et-structure-de-la-ceinture-de-schistes-verts-de-noranda>.

Les observations chimiques, pétrographiques et de terrain .. tectono-stratigraphique des ceintures de roches vertes ouvre des possibilités quant aux . retrouve dans des environnements du faciès mi-crustal des schistes verts (Nesbitt et al., .. tectonique est généralement associée à des structures d'échelle régionale.

16 mars 2017 . Au sein du CCB, on distingue la faille Casa-Berardi, une structure au . located 180 km north of Rouyn-Noranda within Archean rocks of the Abitibi Subprovince. .. Le &grÃ© de mÃ©tamorphisme est celui des schistes verts. .. L'empilement stratigraphique suit une direc- tion moyenne nord-nord-ouest (fig.

